

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА**

ПРОСТОУРИТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ПРОСТОУРИТ

Международное непатентованное или группировочное наименование:~

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий:

Активные компоненты: Прополис – 0,31 г; перга – 0,15 г; апилак (молочко маточное пчелиное) – 0,10 г; пыльца цветочная (обножка) – 0,08 г; мед натуральный – 0,12 г.

Вспомогательные вещества: воск пчелиный – 0,06 г; ланолин безводный – 0,12 г; масло какао – 1,91 г.

Описание

Суппозитории от зеленовато-желтого до зеленовато-коричневого цвета с темными вкраплениями торпедообразной формы, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения хронического простатита.

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Препарат оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Показания к применению

Препарат рекомендуется в комплексной терапии для лечения хронического простатита, геморроя и трещин анального отверстия.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к

продуктам пчеловодства; диарея; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности в данной возрастной группе).

Применение при беременности или в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день на ночь. Длительность курса лечения - 15-30 дней.

При необходимости возможно проведение повторного курса через 2-3 месяца после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В настоящее время случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

ПРОСТОУРИТ может применяться в комплексной терапии.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. Во избежание передозировки, рекомендуется соблюдать режим дозирования препарата. Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 1 недели или ухудшаются, следует обратиться к врачу. Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. До

начала лечения хронического простатита рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Суппозитории ректальные.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ/ПЭ белой комбинированной или из пленки поливинилхлоридной марки ЭП-73.

На контурную ячейковую упаковку допускается наклеивать этикетку из бумаги писчей или этикеточной, или самоклеющуюся этикетку.

1, 2, 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары.

Условия хранения

При температуре от 2 °С до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии от потребителей

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская обл., г. Усолъе-Сибирское

Телефон: +7 (39543) 58910, факс: +7 (39543) 58908

Производитель

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

665462, Иркутская обл., г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 метрах от Прибайкальской автодороги.

Генеральный директор

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

С.В. Тюстин